

Spoštovani starši!

Kdaj je potrebno pripeljati otoka čimprej na pregled k specialistu pediatru (oziroma k izbranemu osebnemu zdravniku) ali NMP (nujno med. pomoč)?

Nujen pregled pri pediatru je potreben?

- če povišana telesna temperatura traja več kot 3 dni ali po obdobju brez temperature leta ponovno poraste in je otrok slabši
- če je star pod 3 mesece in ima temperaturo 38° C ali > kot 38° C
- če je star od 3- 6 mesecev in ima temperaturo 39° ali >kot 39° C
- pri temperaturi > kot 40° C ne glede na starost
- pri nenadno nastali povišani temperaturi brez jasnega vzroka z mrzlico ali brez nje
- če dojenček odklanja dojenje oziroma slabo pije in če malček odklanja tekočino
- če je prizadet, bled, pepelnato moder, se ne odziva ali več spi
- če ob bruhanju in /ali driski odklanja tekočino ali če izbruha tudi majhne količine dane tekočine
- če ima ob bruhanju ali driski znake izsušitve (je brezvoljen, več spi, poležuje, ima suh jezik, vdrte oči, odvaja manj ali nič urina, dojenček ima vdrto mečavo)
- če stoka, težko ali pospešeno diha - število dihov več kot 60 / minuto
- ima krče po celem telesu ali delu telesa (brez ali s povišano temperaturo)
- ima koprivko in oteklino obraza
- se duši in/ali lajajoče kašlja in ima glasen in podaljšan vdih
- ima nestisljiv izpuščaj, modrice po telesu
- če dojenček šibko, cvileče joka ali ves čas joka, stoka odklanja dojko oziroma tekočino.

Starši, ki skrbijo za otroka doma naj PONOVRNO obiščejo zdravnika:

- če se staršem zdi slabši kot takrat, ko so ga pripeljali na pregled
- če povišana temperatura traja več kot 5 dni
- če so starši zaskrbljeni bolj kot takrat, ko so ga pripeljali na pregled
- če se starši ne čutijo sposobni skrbeti za otroka

Otrok z znaki virusne okužbe dihal (nahod, kašelj, povišana telesna temperatura, vnetje očesne veznice) in je ob tem neprizadet, dobro pije, naj obišče zdravnika po 3 dneh. Tako bo imel možnost hitrejši dostop do zdravnika huje bolan in ogrožen otrok.

Alenka Schweiger- Pavlakovič, dr. med.
spec. pediater

